



PENICILLINUM

Pathogenese

Friedrich Witzig

Gemüt.....	2
Schwindel	3
Kopf	3
Augen	4
Sehen.....	5
Ohr.....	5
Hören.....	5
Nase.....	5
Gesicht.....	6
Mund	7
Zähne.....	8
Innerer Hals	9
Äußerer Hals.....	9
Magen.....	9
Abdomen	10
Rektum	12
Stuhl.....	12
Blase	12
Nieren	13
Harnröhre	13
Urin	14
Männliche Genitalien	14
Weibliche Genitalien	14
Kehlkopf.....	15
Atmung.....	15
Husten	16
Auswurf	16
Brust	16
Herz	17
Rücken.....	18
Extremitäten.....	19
Schlaf	20
Frost.....	21
Fieber.....	21
Schweiß	21
Haut	21
Allgemein.....	25
Verwandtschaft	34
Quellen	35

Gemüt

Aggressivität

- Aggressivität (Amoxicillin). [akb]

Angst

- Angst (Amoxicillin). [akb]
- Ängste. [vnf]
- Angstzustände. [psc]
- Extreme Angst (Anaphylaxie). [vnf]
- Todesangst (Hoigné-Syndrom). [mor]

Bewusstlosigkeit

- Früher oder später Bewusstseinsverlust mit Kollaps (Anaphylaxie). [vnf]

Erregung

- Erregung (allergische Zustände). [vnf]
- Erregungszustand (Amoxicillin) (Ampicillin, parenteral) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]
- Erregungszustand bei Niereninsuffizienz (Amoxicillin) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]

Fehler

Routine

- Beeinträchtigung bei der Ausführung von Routine (P. griseofulvin). [vnf]

Urteilsvermögen, Einschätzung

- Beeinträchtigung des Urteilsvermögens (P. griseofulvin). [vnf]

Geisteskrankheit

- Allergische Psychose. [jno]
- Depressive Psychose. [jno]
- Klimakterische Psychose. [jno] [vnf]

Konzentration

- Gehäuft Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. [vnf]

Ruhelosigkeit

- Nervös, unruhig, wenn die Nase verstopft ist. [vnf]
- Ruhelosigkeit (allergische Zustände). [vnf]

Schweigsam

- Abgeneigt zu sprechen bei Zahnschmerz (P. expansum). [vnf]

Störung

- Entweder leicht gestört, oder ein Gefühl von innerer Unsicherheit und Angespanntheit. [vnf]

Traurigkeit

- Alles scheint traurig. [jno] [vnf]
- Depression (Ampicillin). [akb]

- Depressionen (P. griseofulvin). [vnf]
- Depressionen. [psc]
- Traurigkeit in der Menopause. [vnf]

Überaktiv

- Vermehrte Aktivität des Gehirns, schnell gefolgt von beträchtlicher geistiger Erschöpfung. [jno] [vnf]

Untätigkeit

- Lethargie (Ampicillin). [akb]

Verwirrung

- Geistige Umnachtung. [jno]
- Verwirrtheit (Amoxicillin). [akb]
- Verwirrung (P. griseofulvin). [vnf]
- Verwirrung. [vnf]

Wahnideen

- Auditive Halluzinationen (P. griseofulvin). [vnf]
- Halluzinationen (allergische Zustände). [vnf]
- Halluzinationen (Ampicillin). [akb]
- Halluzinationen (Hoigné-Syndrom). [mor]
- Häufig Halluzinationen. [mor]
- Wahnvorstellungen, fixe Ideen. [psc]

Schwindel

- Schwindel (Anaphylaxie). [vnf]
- Schwindel (Hoigné-Syndrom). [mor]
- Schwindel (Pipracillin). [akb]
- Schwindel, Verschlimmerung durch Bewegung, mit Übelkeit. [jno]
- Schwindeligkeit, Benommenheit (P. griseofulvin). [vnf]

Kopf

Entzündung

- Aseptische Meningitis (Amoxicillin). [akb]

Schmerz

- Die frühesten und häufigsten Beschwerden [der Balkan-epidemischen Nephropathie] sind Kopfschmerz, Mattigkeit, Abgespanntheit, leichte Ermüdbarkeit und Anorexie (P. cyclopium). [vnf]
- Es kann die Ursache von Kopfschmerz sein. [vnf]
- Kongestiver Kopfschmerz. [jno]
- Kopfschmerz (intrathecale Anwendung von Penicillin). [vnf]
- Kopfschmerzen (P. griseofulvin) (Ampicillin) (Pipracillin). [akb] [vnf]

Begleitet

- Gesichtsröte gefolgt von Blässe mit dumpfem, anhaltendem Stirnkopfschmerz. [vnf]

Hinterkopf

- Schmerz im Bereich des Hinterkopfs und unmittelbar darunter, < beim Erwachen und abends (P. expansum). [vnf]

Seite

- Rechtseitiger Kopfschmerz. [vnf]

Stirn

- Stirnkopfschmerz mit Sinusitis. [jno] [vnf]

Dumpf

- Dummer Schmerz, schießt durch den Kopf auf der rechten Seite, beginnt im Rücken bis hoch in den Scheitel. [vnf]

Scharf

- Scharfer Schmerz in der Stirn über der linken Seite (P. expansum). [vnf]

Schwere

- Schwere des Kopfes mit Übelkeit, schlimmer durch Bewegung, besser durch Hinlegen und Ruhen, besser durch Essen. [jno] [vnf]

ZNS-Toxizität

- ZNS-Toxizität (Ampicillin, parenteral). [akb]

Augen

Ekchymose

- Blutunterlaufene Augen. [psc]
- Ekchymose. [vnf]

Entzündung

- Allergische Konjunktivitis. [jno]
- Blepharitis, Entzündung der Lider. [jno]
- Dakryozystitis, Entzündung des Tränensacks. [jno]
- Häufige Augenreizungen. [vnf]
- Konjunktivitis mit geschwollenen Lidern, besonders der Unterlider. [jno]
- Konjunktivitis mit verklebten Lidern am Morgen. [jno]

Gerstenkorn

- Gerstenkörner. [jno]
- Langsam sich entwickelndes Gerstenkorn. [jno] [vnf]

Müdigkeitsgefühl

- Wenn sie las, fühlten sich Ihre Augen müde. [vnf]

Ödem

- Aufgedunsene Augen morgens. [vnf]

- Aufgedunsene Unterlider morgens. [vnf]
- Retinaödem (P. griseofulvin). [vnf]

Photophobie

- Sie bemerkte, dass es ihr schwerer fiel das Sonnenlicht zu nutzen. [vnf]

Schmerz

- Als wenn an den Augen gezogen wird, beim Blicken zur Seite. [vnf]
- Die Augen fühlten sich an, als würde daran gezogen. [vnf]
- Neuralgischer Schmerz über und hinter dem rechten Auge. [vnf]
- Rechtseitige Neuralgie über und hinter dem Auge. [jno]

Tränen

- Augen voller Tränen. [jno]

Sehen

Farben

Grün

- Verändertes Farbsehen, Grünstich (P. griseofulvin). [vnf]

Verschwommen

- Konnte die Nummern auf der Anzeigetafel der Lieder seit einem Jahr wieder sehen. [vnf]
- Verschwommen Sehen (P. griseofulvin). [vnf]
- Zum ersten Mal nach Monaten wieder klares Sehen. [vnf]

Ohr

Geräusche

- Summen, surren, brummen, schwirren in den Ohren. [jno]

Hautausschlag

- Eiterbeulen oder Ekzem im Gehörgang. [jno] [vnf]

Hören

Hörverlust

- Hörverlust begleitet von chronischer Diarrhoe. [vnf]
- Hörverlust begleitet von Fieber. [vnf]

Nase

Absonderung

- Absonderung aus der Nase im Wechsel mit Verstopfung. [vnf]
- Absonderung von Blut und Eiter, dann wieder nicht. [vnf]
- Die Nase lief fürchterlich, ganz dünner wässriger Schleim, läuft anfallsweise, konnte kaum rechtzeitig das Taschentuch nutzen. [vnf]

- Nase lief ganz ungehindert nach Trinken von Wasser. [vnf]
- Nasenabsonderung dick und gelb. [vnf]
- Nasenabsonderung ganz weiß. [vnf]
- Wässrige Absonderung, nachts und reichlich. [vnf]

Entzündung

- Akute und chronische Sinusitis. [jno]
- Purulente Entzündung der Nase (Rhinitis). [jno] [vnf]
- Sinusitis frontalis, rechts. [jno]
- Wiederkehrende Rhinopharyngitis. [jno]

Geruch

- Anosmie. [jno]

Nasenbluten

- Nasenbluten. [akb] [psc]
- Nasenbluten (Amoxicillin). [akb]

Niesen

- Viel Niesen in der Nacht. [vnf]

Ozäna

- Stinknase (Ozäna). [jno]

Schnupfen

- Schnupfen mit gelber, dicker Absonderung, sich hinziehend. [jno]
- Schnupfen vom Influenza-Typ. [jno]

Schwellung

- Schwellung und Enge in der Nase (Anaphylaxie). [vnf]
- Gefühl von Schwellung am Nasenrücken im Bereich des Rachens. [vnf]

Verstopfung

- Verstopfung der Nase, dem Niesen vorausgeht. [vnf]
- Verstopfung der Nase, wenn es das erste Mal kalt wird. [vnf]

Gesicht

Farbe

- Erröten des Gesichts am Abend. [vnf]
- Plötzliches Erröten am späten Nachmittag. [vnf]
- Rötung (Flush) des Gesichts (Anaphylaxie). [vnf]
- Rötung des Gesichts, gefolgt von Gesichtsblassheit. [vnf]

Gefühllosigkeit

- Gefühllosigkeit der Lippen (P. roqueforti). [vnf]

Hautausschlag

- Eiterbeulen besonders im Gesicht mit Ödem. [jno] [vnf]
- Hautausschlag um den Mund (P. roqueforti). [vnf]
- Herpes-ähnliche Hautausschlag im Gesicht. [jno] [vnf]
- Tuberöse Akne. [jno]

Jucken

- Jucken um das Gesicht und Nacken am Abend. [vnf]

Schmerz

- Gesichtsneuralgie. [jno]

Schwellung

- Gesichtsödem. [akb]
- Schwellung des Gesichts, der Lippen, der Lider (Anaphylaxie). [vnf]

Mund

Blutung

- Leicht blutendes Zahnfleisch. [jno]

Eindrücke

- Deutliche Zahneindrücke am Zungenrand. [jno]

Entzündung

- Entzündung im Mund bei Penicillosis (P. marneffeii). [vnf]
- Gingivitis. [jno]
- Glossitis. [akb] [vnf]
- Stomatitis (P. griseofulvin). [vnf]
- Stomatitis. [akb] [vnf]

Farbe

Gelb

- Zunge an der Basis gelbbraun, ohne Papillen. [jno]

Rot

- Rote Schleimhaut mit weißen Flecken. [jno]

Schwarz

- Farbveränderung der Zunge – schwarze Haarzunge (Amoxicillin). [akb]
- Schwarze, pelzig belegte Zunge (P. griseofulvin). [vnf]

Geschmack

- Geschmacksveränderung (P. griseofulvin). [vnf]
- Metallischer Geschmack. [vnf]
- Pelzige Zunge. [akb]
- Seltsamer Geschmack im Mund (Anaphylaxie). [vnf]

- Störung des Geschmacksinns (Ampicillin) (Mezlocillin) (Sultamicillin). [akb] [mor]
- Vorübergehende Störung des Geschmacksinns. [akb]

Papillen

- Fehlende Papillen auf der Zunge. [vnf]

Schmerz

- Brennende, schmerzhaftige Zunge (P. griseofulvin). [vnf]
- Dentale Arthrose. [jno]
- Häufige Reizungen im Mund. [vnf]
- Zungenbrennen. [mor]

Schwellung

- Schwellung der Zunge (P. roqueforti). [vnf]

Soor

- Mundsoor - Superinfektion. [akb]

Trockenheit

- Mundtrockenheit. [akb] [mor]
- Trockenheit des Mundes (P. griseofulvin). [vnf]
- Trockenheit des Mundes mit und ohne Durst. [vnf]

Zähne

Farbe

- Reversible Farbveränderung der Zähne (Amoxicillin). [akb]
- Zahnverfärbungen. [mor]

Fluorose

- Fluorose-ähnliche Schädigung des Zahnschmelzes bei Säuglingen und Kleinkindern (Amoxicillin). [akb]

Lang

- Zähne fühlen sich an, als wären sie zu lang (P. expansum). [vnf]

Schmerzen

- Intermittierende neuralgische Schmerzen (P. expansum). [vnf]
- Manchmal Zahnschmerz im Unterkiefer (P. expansum). [vnf]
- Zahnschmerz in der oberen rechten Seite, wechselt von Ort zu Ort (P. expansum). [vnf]
- Zahnschmerzen (P. expansum). [vnf]
- Zahnschmerzen < durch heiße und kalte Getränke und Speisen (P. expansum). [vnf]
- Zahnschmerzen erstrecken sich in den Kopf (Hinterkopf), in die Wangen und den Nacken (P. expansum). [vnf]
- Zahnschmerzen in den oberen Schneidezähnen und Eckzahn, rechts, erstreckt sich in den rechten Oberkiefer. [jno] [vnf]

Scharf

- Die Schneidezähne fühlen sich scharf an (P. expansum). [vnf]

Innerer Hals

Entzündung

- Follikuläre Tonsillitis. [vnf]

Geschwüre

- Ösophagusgeschwür (Ampicillin). [akb] [mor]

Räuspern

- Muss sich häufig räuspern, wegen klebrigem Schleim im Kehlkopf. [vnf]

Schlucken

- Schluckstörung. [akb]

Schmerz

- Angina, mit subfebriler Temperatur, sich dahinschleppend und wiederkehrend. [jno]
- Anginen. [jno]
- Gehäuft wunder Hals. [vnf]

Schwellung

- Schwellung und Enge im Rachen (Anaphylaxie). [vnf]

Äußerer Hals

Kropf

- Myxödem. [jno] [vnf]
- Schilddrüsenfehlfunktion. [jno]
- Schilddrüsen-Unterfunktion. [jno]

Magen

Appetit

- Häufig Appetitlosigkeit. [akb] [mor]
- War den ganzen Tag hungrig, besonderes Verlangen nach Mittagessen. [vnf]

Blutung

- Magen-Darm-Blutung (Ampicillin). [akb]

Brechreiz

- Brechreiz. [akb]
- Häufig Brechreiz (Amoxicillin). [akb]

Candidose

- Candidose des Magen-Darm-Traktes. [akb]
- Gelegentlich Candidose des Magen-Darm-Traktes (Amoxicillin). [akb]

Durst

- Citrinin: vermehrter Wassergenuss (P. chrysogenum). [vnf]
- Durst (P. griseofulvin). [vnf]
- Durst mitten in der Nacht. [vnf]

Entzündung

- Gastritis. [akb]

Erbrechen

- Erbrechen (intrathecale Anwendung von Penicillin). [vnf]
- Erbrechen (P. griseofulvin). [vnf]
- Erbrechen geht oft dem Zittern voraus (P. roqueforti). [vnf]
- Es kann die Ursache von Erbrechen sein. [vnf]
- Häufig Erbrechen (Amoxicillin). [akb]
- Häufig Erbrechen. [akb] [mor]

Geschwür

- Magengeschwür. [mor]

Schmerzen

- Epigastrische und periumbilikale krampfartige Schmerzen mit abdomineller Tympanitis (Blähsucht). [jno]
- Magenschmerzen. [akb]

Sodbrennen

- Sodbrennen (P. griseofulvin). [vnf]

Störung

- Häufig Magen-Darm-Störung (Ampicillin). [akb]
- Magen-Darm-Störung. [akb]
- Sauere Dyspepsie. [jno]
- Sehr häufig Magen-Darm-Störung (Amoxicillin). [akb]

Übelkeit

- Häufig Übelkeit. [akb] [mor] [vnf]
- Häufig Übelkeit (Amoxicillin). [akb]
- Nausea (P. griseofulvin). [vnf]
- Übelkeit [Mycophenolic acid] (P. roqueforti). [vnf]

Völlegefühl

- Vermehrtes Völlegefühl nach dem Abendessen. [vnf]

Abdomen

Blähungen

- Aufgetriebenes Abdomen [PR-Toxin] (P. roqueforti). [vnf]

- Blähungen. [akb]
- Flatulenz (P. griseofulvin). [vnf]
- Häufig Blähungen (Amoxicillin). [akb]
- Häufig Meteorismus. [mor]
- Recht Aufgetrieben nach dem Essen. [vnf]

Entzündung

- Cholestatische Hepatitis (Pipracillin). [akb]
- Colitis, auch hämorrhagische. [akb]
- Enterokolitis. [akb]
- Entzündung der Gallenwege. [jno]
- Granulomatöse Hepatitis. [vnf]
- Hepatitis (Amoxicillin) (Ampicillin). [akb] [mor]
- Hepatitis bei Neugeborenen. [mor]
- Pseudomembranöse Colitis. [akb] [mor] [vnf]
- Reaktive Hepatitis. [mor]

Erweiterung

- Leber und Milzschwellung (P. marneffeii). [vnf]
- Patulin, ein allgemeines Cytotoxin mit hämorrhagischen Peristaltik-Effekten verursacht eine Erweiterung des Intestinaltraktes bei Labortieren (P. cyclopium). [vnf]

Cholestase

- Cholestase (Amoxicillin) (Ampicillin) (Pipracillin). [akb] [mor]
- Gallenstau. [vnf]

Leber

- Leberschaden (Amoxicillin). [akb]

Hitze

- Hitzewallungen vom Abdomen aufsteigend am Nachmittag. [vnf]

Malabsorption

- Malabsorption. [mor]

Peristaltik

- Vermehrte oder verminderte Darmbewegung (P. roqueforti). [vnf]

Rumoren

- Darmkollern. [psc]

Schmerz

- Abdominalschmerzen. [akb]
- Abdominalspasmen. [akb]
- Bauchkrämpfe. [psc]

Vergrößerung

- Milzvergrößerung bei Penicillosis (*P. marneffei*). [vnf]
- Vergrößerung der Leber bei Penicillosis (*P. marneffei*). [vnf]

Rektum

Diarrhoe

- Blutige Diarrhoe. [akb]
- Citrinin: wässrige Diarrhoe (*P. chrysogenum*). [vnf]
- Diarrhoe (Ampicillin, parenteral). [akb]
- Diarrhoe (*P. griseofulvin*). [vnf]
- Diarrhoe [Mycophenolic acid] (*P. roqueforti*). [vnf]
- Diarrhoe bei Penicillosis (*P. marneffei*). [vnf]
- Es kann die Ursache von Durchfällen sein. [vnf]
- Häufig Diarrhoe (Amoxicillin) (Sultamicillin). [akb]
- Häufig Diarrhoe. [akb] [mor] [vnf]

Abwechselnd

- Durchfall oder Verstopfung nach Antibiose. [psc]

Entzündung

- Proktitis: sehr hilfreich im Wechsel mit *Rhus tox.* (*P. expansum*). [vnf]

Hämorrhoiden

- Blutende, schmerzhaft Hämorrhoiden. [psc]

Jucken

- Analer Juckreiz. [vnf]
- Quälender Analjuckreiz. [psc]

Obstipation

- Obstipation ohne Stuhldrang. [jno]

Schmerz

- Durchbohrende, aufspießende, stechende Schmerzen das Rektum hoch (*P. expansum*). [vnf]

Stuhl

Weich

- Weiche Stühle (Ampicillin, parenteral). [akb]

Blase

- Oligurie. [akb]

Nieren

Degeneration

- Das Syndrom (Nephropathie) beginnt schleichend zwischen dem 30- und 60sten Lebensjahr, besonders bei Frauen, nie akut (P. cyclopium). [vnf]
- Degenerative Nierenerkrankung bei Hühnern, Truthühnern und Enten [Citrinin] (P. chrysogenum). [vnf]
- Verursacht chronische Nierenerkrankung beim Menschen und wird chronische Balkan Nephropathie genannt (P. cyclopium). [vnf]

Entzündung

- Glomerulonephritis. [mor]
- Häufig Interstitielle Nephritis. [akb] [mor] [vnf]
- Nephritis (Amoxicillin). [akb]
- Nephritis mit Proteinurie einhergehend. [jno]
- Nephritis. [akb]

Krankheit

- Lipoidnephrose. [jno]

Krebs

- Maligne Tumoren des Harnsystems findet man in 30 bis 40% der erkrankten Patienten mit Balkan endemischer Nephropathie (P. cyclopium). [vnf]

Nekrosen

- Verursacht nekrotische Nephropathie bei Schweinen (P. cyclopium). [vnf]

Nephrotoxin

- Nephrotoxisch [Citrinin] (P. chrysogenum). [vnf]
- Nephrotoxisch [Ochratoxin A] (P. cyclopium). [vnf]

Schmerz

- Beidseitiger Schmerz in den Nieren, erstreckt sich in die Lumbo-Sakralregion. [jno] [vnf]

Versagen

- Akutes Nierenversagen (Ampicillin). [akb]
- Der vermehrte Konsum von Schweinefleisch und Speck in einigen ländlichen Gegenden Dänemarks wurde in Verbindung gebracht mit erhöhter Todesrate infolge von Nierenversagen (P. cyclopium). [vnf]
- Nierenversagen (Ampicillin). [akb]
- Selten Nierenversagen. [mor]

Harnröhre

- Jucken
- Reizung der unteren Harnwege mit Juckreiz und Brennen. [psc]

Urin

Blut

- Das typische [Balkan endemische Nephropathie]-Syndrom zeigt sich in einer gelegentlichen Hämaturie (P. cyclopium). [vnf]
- Hämaturie. [akb]

Eiweiß

- Eiweiß im Urin mit Ödembildung. [jno]
- Eiweißhaltiger Urin. [jno]
- Proteinurie (P. griseofulvin). [vnf]
- Proteinurie. [akb]

Sediment

- Kristallurie (Amoxicillin). [akb]
- Kristallurie (Ampicillin, parenteral). [akb]
- Viele Ablagerungen von Steinen im Urin (P. expansum). [vnf]
- Zylinder (P. griseofulvin). [vnf]

Spärlich

- Urin spärlich. [jno] [vnf]
- Spärlicher Urin. [vnf]

Männliche Genitalien

Entwicklung

- Verzögerte sexuelle Entwicklung (P. cyclopium). [vnf]

Fertilität

- Verminderte Fertilität [Roquefortin C] (P. roqueforti). [vnf]

Missbildung

- Abnormale Genitalien (P. griseofulvin). [vnf]

Weibliche Genitalien

Abort

- Abort bei Kühen [Roquefortin C] (P. roqueforti). [vnf]

Entwicklung

- Erniedrigt die Produktion von Eiern bei Junghennen (P. cyclopium). [vnf]
- Verzögerte sexuelle Entwicklung (P. cyclopium). [vnf]

Entzündung

- Vulvovaginitis – Superinfektion. [akb]

Fertilität

- Verminderte Fertilität [Roquefortin C] (P. roqueforti). [vnf]

Fluor

- Leukorrhoe gelb oder weiß, mild. [jno] [vnf]

Jucken

- Vaginaler Juckreiz. [vnf]

Menses

- Hypomenorrhoe. [jno]
- Menses verspätet und spärlich (weniger reichlich). [jno] [vnf]
- Sekundäre Amenorrhoe. [jno]

Missbildung

- Abnormale Genitalien (P. griseofulvin). [vnf]

Retention

- Plazentaretention [Roquefortin C] (P. roqueforti). [vnf]

Kehlkopf

Entzündung

- Ösophagitis. [vnf]

Krampf

- Laryngospasmus. [akb]

Stimme

- Heiserkeit, die sich zu vollständiger Aphonie (Stimmlosigkeit) entwickelt. [vnf]
- Schmerzlose Heiserkeit, schlimmer am Morgen; Sprechen kostete Mühe. [vnf]
- Schwerer Anfall von Heiserkeit. [vnf]

Wassersucht

- Glottisödem (Typ I Allergie). [mor]
- Larynx-Ödem. [akb] [jno]

Atmung

Apnoe

- Apnoe bei anaphylaktischem Schock. [akb]

Asthma

- Asthma. [vnf]
- Asthmatische Atmung um 4 Uhr morgens. [vnf]
- Asthmatischer Atemnot mit trockenem Husten. [jno]
- Bronchial-Asthma. [jno]
- Eingeatmete Pilzsporen können Asthma verursachen. [vnf]
- Penicillium-Arten sind gewöhnlich Ursache für eigentliches Asthma. [vnf]
- Quälende asthmatische Atmung mit schwierigem Auswurf. [vnf]

- Um 4:40 Uhr ein schwerer Anfall im Bett; konnte kaum Luft bekommen; als ob etwas den Hals verschließen würde; erwachte plötzlich, als ob sie geschlagen worden wäre; besser, wenn sie ruhig lag; dauerte eine Stunde; um 8 Uhr fühlte sie sich wieder in Ordnung. [vnf]

Atemnot

- Asthmatische Atemnot um 4 Uhr morgens. [jno] [vnf]
- Dyspnoe (Amoxicillin). [akb]
- Dyspnoe. [akb]
- Schnell außer Atem morgens beim Erwachen. [vnf]
- Schwierigkeit, tief einzuatmen wegen Wundheit und Schmerz um das Herz. [vnf]

Flach

- Die Atmung ist flach oder [knirschend, schnarrend, knisternd, zischend], stridorös (Anaphylaxie). [vnf]

Frequenz

- Verminderte Atemfrequenz [PR-Toxin] (P. roqueforti). [vnf]

Versagen

- Tod im Atemversagen (Anaphylaxie). [vnf]

Husten

Trocken

- Trockener, heiserer (rauer) Husten, manchmal anfallsweise, veranlasst den Patienten sich nach vorne zu beugen, besser in Ruhe. [jno] [vnf]

Auswurf

Dick

- Auswurf gelb oder weißlich-gelb. [vnf]
- Gelber oder gelblichweißer, dicker Auswurf. [jno]

Brust

Beklemmung

- Beklemmung in der Brust (Anaphylaxie). [vnf]

Ektasen

- Bronchiektasen. [jno]

Emphysem

- Lungenemphysem. [jno]

Entzündung

Bronchien

- Gehäuft Bronchitis. [vnf]

Fibrose

- Idiopathische, interstitielle Lungenfibrose. [jno]

Lunge

- Flüchtige pulmonale Infiltrate in wechselnder Ausprägung, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Lungensymptome bei Penicillosis (P. marneffeii). [vnf]

Mamma

- Mastitis

Hitze

- Hitzewallung von der Mitte der Brust aufsteigend am Nachmittag, aber nur für kurze Zeit; die Stelle ist gerötet. [vnf]

Hypertrophie

- Abnormale Mammae (P. griseofulvin). [vnf]

Katarrh

- Die Stimmlosigkeit hielt einige Tage an und endete in einer scharfen Attacke von Bronchialkatarrh. [vnf]
- Während des Katarrhs war ich für ein, zwei Tage nicht fit bei der Arbeit. [vnf]

Schmerz

- Schmerz in der rechten Brustwand (P. expansum). [vnf]
- Sternale und Suprasternale, oberhalb des Sternums gelegene Schmerzen. [jno]

Schwere

- Gefühl eines Gewichts auf der Brustvorderseite. [vnf]

Silikose

- Silikose. [jno]

Spasmen

- Bronchospasmen. [akb] [vnf]
- Bronchospastik (Typ I Allergie). [mor]
- Citrinin: Bronchospasmen (P. chrysogenum). [vnf]

Herz

EKG

- EKG-Veränderungen – ST-Veränderungen. [akb]
- Extrasystolen. [jno]
- QT-Verlängerung. [mor]

Entzündung

- Myokarditis. [akb]
- Rheumatische Myokarditis. [jno]
- Rheumatische oder tuberkulöse Perikarditis. [jno] [vnf]

Krankheit

- Herzbeschwerden begleitet von Beschwerden der Schilddrüse. [vnf]
- Herzbeschwerden in Verbindung mit Hypothyreose. [jno]

Puls

Beschleunigt

- Beschleunigter, unregelmäßiger Puls. [jno]
- Der Puls ist beschleunigt und fadenförmig (Anaphylaxie). [vnf]
- Gesichtsröte gefolgt von Blässe mit schnellem Herzschlag am Nachmittag, mit anschließendem Druck im Scheitel und Hinterkopf. [vnf]

Unregelmäßig

- Arrhythmien. [mor]

Verlangsamt

- Bradykardie (Hoigné-Syndrom). [mor]

Schmerz

- Präkordialschmerz, schlimmer beim Erwachen. [jno]

Stillstand

- Asystolie. [mor]
- Herzstillstand (Hoigné-Syndrom). [mor]

Störungen

- Herzkreislaufstörung. [akb]

Vergrößerung

- Kardiomegalie. [akb]

Versagen

- Herzkreislaufversagen bei Schock. [akb]
- Kreislaufversagen. [akb]
- Tod im Herz-Kreislaufversagen (Anaphylaxie). [vnf]

Rücken

Jucken

- Jucken um den Nacken beim Entkleiden nachts. [vnf]
- Jucken um die Taille bei Nacht. [vnf]

Schmerz

- Häufig Rückenschmerzen. [vnf]
- Rheumatische Schmerzen in den Muskeln und Lumbosakral (small of back). [vnf]
- Rückenschmerz, recht scharf, im unteren Mittel-Bereich; recht beständig, den ganzen Tag anhaltend; besser durch Zitronensaft. [vnf]
- Schmerzen im Nacken, hauptsächlich rechts (P. expansum). [vnf]

Schwellung

- Schmerzhafte Lymphknotenschwellung im Nacken unterhalb der Ohren (P. expansum). [vnf]

Steifheit

- Nackensteifigkeit (intrathecale Anwendung von Penicillin). [vnf]

Extremitäten

Farbe

Blau

- Acrocyanose. [jno] [vnf]

Gelb

- Das typische [Balkan endemische Nephropathie]- Syndrom zeigt sich in einer Gelbfärbung von Handfläche und Fußsohlen (P. cyclopium). [vnf]

Gefühllosigkeit

- Gefühllosigkeit in den Händen, Armen und Beinen nachts im Bett (P. expansum). [vnf]
- Gefühllosigkeit in der rechten Hand und im rechten Fuß. [vnf]

Gewicht

- Am Nachmittag ein seltsames Gefühl von einem Gewicht und Gefühllosigkeit im zweiten und dritten Zehens rechts. [vnf]

Kälte

- Extremitäten kalt und eingeschlafen. [vnf]
- Kälte der Extremitäten mit Parästhesie. [jno]

Krämpfe

- Heftiger Krampf im rechten Bein bei Nacht (P. expansum). [vnf]

Kribbeln

- Kribbelnde, prickelnde Empfindung in den Unterschenkeln und Füßen in Intervallen, besonders im Sitzen. [vnf]

Nadeln

- Gefühl, als würden Nadeln in der rechten Zehe stecken. [vnf]

Ruhelosigkeit

- Restless legs. [psc]
- Unruhige Beine, Restless legs".[psc]

Schmerzen

- Blitzartige Schmerzen, schlimmer durch Bewegung, begleitet von Pieken, Stechen unter der Haut, schlimmer gegen 4 Uhr morgens und nach 18 Uhr. [jno]
- Gelenkschmerzen und Schwellung der Muskeln und in der Lumbalregion, schlimmer von der leisesten Bewegung. [vnf]
- Schießende Schmerzen in verschiedenen Teilen der Arme und Beine, < bei Nacht (P. expansum). [vnf]

Arm

- Gefühl eines Gewichts auf der Brust mit recht scharfen Schmerzen im linken Arm und unter dem linken Schulterblatt. [vnf]

Schulter

- Schmerzen in der rechten Kugel der Schulter, schlimmer bei Nacht und leichter Bewegung, besser durch Druck und Wärme (P. expansum). [vnf]
- Schmerz in der rechten Schulter und der Innenseite des rechten Ober- und Unterarms (P. expansum). [vnf]
- Schmerz in der linken Schulter und Arm (P. expansum). [vnf]

Finger

- Weher Schmerz in den Fingern und Fingerspitzen (P. expansum). [vnf]

Beine

- Intermittierende Schmerzen in den Beinen (P. expansum). [vnf]

Schwäche

- Schwäche der Beine [PR-Toxin] (P. roqueforti). [vnf]

Wassersucht

- Hände und Füße gedunsen mit Druck. [vnf]
- Aufgedunsene Hände am Morgen. [vnf]

Schlaf

Erwachen

- Erwachen früh am Morgen gegen 4 Uhr, mit einem Gefühl des Unbehagens [Verdross, Sorge, Qual]. [vnf]

Gestört

- Schlafstörungen. [psc]
- Schlafstörungen (Amoxicillin). [akb]

Schlaflosigkeit

- Schlaflosigkeit (P. griseofulvin). [vnf]

Schläfrigkeit

- Häufig Somnolenz bei älteren Patienten. [mor]
- Schläfrigkeit nachmittags. [vnf]
- Schläfrigkeit. [vnf]

Unterbrochen

- Der Schlaf ist jede Nacht häufig unterbrochen [fits and spells] bis 4:30 Uhr. [vnf]

Tief

- Tiefer oder leichter Schlaf. [vnf]
- Tiefer oder leichter Schlaf, mit sehr frühem Erwachen, gegen 4 Uhr morgen, mit einem Gefühl von Unwohlsein. [jno]

Frost

Frösteln

- Frösteln. [jno] [vnf]

Schüttelfrost

- Schüttelfrost. [akb]
- Schüttelfrost (Mezlocillin). [akb]

Fieber

Allgemein

- Fieber – erhöhtes Risiko bei Patienten mit zystischer Fibrose (Pipracillin). [akb]
- Fieber (Amoxicillin). [akb]
- Fieber bei Penicillosis (P. marneffeii). [vnf]
- Fieber sind allgemein bekannt. [vnf]
- Fieber, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Fieber. [akb] [vnf]

Kontinua

- Kontinuierliches Fieber, 38°C am Abend, für sehr lange Zeit. [jno]

Subfebril

- Subfebrile Fieberzustände, lange sich hinziehend. [jno]
- Subfebriler Zustand mit leicht erhöhter Temperatur, steigt nicht höher als 38°C. [jno]

Temperatur

- Hyperthermie. [vnf]

Schweiß

Kalt

- Der Patient ist bedeckt von kaltem Schweiß (Anaphylaxie). [vnf]

Warm

- Warmer oder kalter Schweiß, mit abgestandenem Geruch. [jno] [vnf]

Haut

Allergie

- Allergische Hautreaktion. [akb]

Blutung

- Ekchymose (Pipracillin). [akb] [jno]
- Purpura (Mezlocillin). [akb]
- Purpura Schönlein-Henoch. [jno] [vnf]
- Purpura, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]

- Purpura. [akb]
- Thrombozytopenische Purpura (Typ II Allergie). [akb] [mor]

Entzündung

- Kontakt-Dermatitis. [vnf]
- Kontaktdermatitis, 12 – 48 Stunden nach Exposition (Typ IV Allergie). [mor]

Erschlaffung

- Schlappe Haut. [vnf]

Farbe

Gelb

- Cholestatischer Ikterus. [mor]
- Ikterus (Amoxicillin). [akb]

Grau

- Die Haut wird aschfahl, kalt und klamm (Anaphylaxie). [vnf]

Pigmentierung

- Hyperpigmentierung (P. griseofulvin). [vnf]

Kupferfarben

- Das typische [Balkan endemische Nephropathie]- Syndrom zeigt sich in einer seichten kupferfarbigen Haut (P. cyclopium). [vnf]

Rot

- Dermographismus. [vnf]

Gangrän

- Nach i.m. Injektion von Depotpenicillinen bei Kindern in seltenen Fällen Gewebeschäden bis zum Gangrän, Schmerzen, Muskelveränderungen oder Thrombosen. [mor]

Hautausschlag

- Andere Patienten entwickeln Hautausschläge, charakterisiert durch Rötung und Juckreiz, Papeln, Bläschen oder Blasenbildung, die sich zu einer exfoliativen Dermatitis ausweiten können. [vnf]
- Exsudative oder proliferative Dermatose. [jno]
- Hartnäckige Haut- oder Schleimhautproblemen mit Juckreiz und Brennen. [psc]
- Häufig Hautausschlag, bei Patienten mit zystischer Fibrose (Pipracillin). [akb]
- Hautausschlag (Amoxicillin). [akb]
- Hautausschläge bei Penicillose (P. marneffe). [vnf]
- Hautausschläge. [akb] [vnf]
- Hautreaktionen (Ampicillin, Amoxicillin, Cycloacillin, Epicillin). [mor]

Absonderung

- Muco-purulenter Hautausschlag. [jno] [vnf]

Akne

- Akneartiger Hautausschlag im Gesicht, am Körper und den Extremitäten (P. marneffe). [vnf]

Bläschen

- Bläschenförmiger Hautausschlag (P. griseofulvin). [vnf]

Blase

- Großblasiger, bullöser Hautausschlag (P. griseofulvin). [vnf]

Candidosis

- Candidosis der Haut und der Schleimhäute. [akb]
- Epidermo-Mykosis, absondernd, aufgeweicht, aufgequollen, impetiginös. [jno]

Dermatitis

- Bullöse Dermatitis. [akb]
- Dermatitis exfoliativa. [akb]
- Exfoliative Dermatitis (P. griseofulvin). [vnf]

Eiterbeulen

- Wiederkehrende Eiterbeulen. [vnf]

Ekzem

- Chronisches Ekzem (P. expansum). [vnf]
- Ekzem mit Absonderung klarer Flüssigkeit. [jno]

Erythem

- Erythema exsudativa multiforme (Ampicillin). [akb]
- Erythema exsudativa multiforme, 12 – 48 Stunden nach Exposition (Typ IV Allergie). [mor]
- Erythema exsudativa multiforme. [akb]
- Häufiges Erythem (Ampicillin). [akb]
- Multiformes Erythem (P. griseofulvin). [vnf]

Exanthem

- Ampicillinexanthem. [mor]
- Fixes Exanthem, 12 – 48 Stunden nach Exposition (Typ IV Allergie). [mor]
- Fixes Exanthem, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Flüchtige Exantheme sind allgemein bekannt. [vnf]
- Flüchtiges Exanthem (P. griseofulvin). [vnf]
- Flüchtiges Exanthem. [vnf]
- Häufig makulopapulöses Exanthem, verstärkt bei Patienten mit lymphatischer Leukämie (Ampicillin). [akb]
- Häufig makulopapulöses Exanthem, verstärkt bei Patienten mit Mononukleose (Ampicillin). [akb]
- Häufig makulopapulöses Exanthem, verstärkt in Kombination mit Allopurinol (Ampicillin). [akb]
- Makulo-papulöses Exanthem. [akb]
- Morbilliformes Exanthem (Amoxicillin). [akb]
- Nichtallergische makulopurulente Hautausschläge. [jno]
- Polyforme Exantheme, 12 – 48 Stunden nach Exposition (Typ IV Allergie). [mor]
- Pustulöses Exanthem (Amoxicillin) (Ampicillin) (Sultamicillin). [akb]

Furunkel

- Furunkel. [jno]
- Krankengeschichte von wiederkehrenden Furunkeln. [vnf]
- Variiert mit Furunkeln. [jno]
- Wiederkehrende Furunkulose. [jno]

Lichen

- Lichen planus (P. griseofulvin). [vnf]

Masern

- Häufig morbilliformes Exanthem (Ampicillin). [akb]
- Morbilliformes, auch skarlatiformes Exanthem. [akb]
- Morbilliforme Exantheme, 12 – 48 Stunden nach Exposition (Typ IV Allergie). [mor]
- Morbilliformer Hautausschlag (P. griseofulvin). [vnf]

Pemphigus

- Pemphigus. [vnf]
- Pemphigus (P. griseofulvin). [vnf]
- Selten Pemphigus (Ampicillin). [akb]

Pusteln

- Generalisierte exanthematische Pustulose (Amoxicillin) (Ampicillin). [akb]

Urticaria

- Die häufigst beobachtete Reaktion ist die Urtikaria, die häufig an der Handfläche und Fußsohle beginnen und dann generalisieren. [vnf]
- Kontakt-Urtikaria. [vnf]
- Urtikaria (Amoxicillin). [akb]
- Urtikaria (P. roqueforti). [vnf]
- Urtikaria (Typ I Allergie). [mor]
- Urtikaria, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Urtikaria, kalt und warm (P. griseofulvin). [vnf]
- Urtikaria. [akb] [jno] [vnf]
- Urtikarielle Sofortreaktion deutet meist auf echte Penicillinallergie hin. [akb]
- Urtikarielles Exanthem. [mor]

Juckreiz

- Genereller Juckreiz (Anaphylaxie). [vnf]
- Jucken am ganzen Körper am Morgen, sehr ausgeprägt. [vnf]
- Juckreiz an Stellen mit Pilzbefall. [psc]
- Pruritus. [akb]
- Pruritus (Amoxicillin) (Ampicillin). [akb]

Kratzen

- Der Patient kratzt sich blutig. [psc]

Kondylome

- Kondylome. [jno]

Nekrose

- Toxische epidermale Nekrolyse. [akb]

Photosensibilität

- Empfindlich auf Sonnenbestrahlung (P. griseofulvin). [vnf]
- Sonnenbrand-Reaktivierung (Ampicillin). [akb]

Reizung

- Hautreizung (P. piceum). [vnf]

Risse

- Risse und Rhagaden, besonders an den Haut-Schleimhaut-Grenzen. [psc]

Sensibilisierung

- Hypersensibilisierung (P. piceum). [vnf]

Tumore

- Gutartige Tumore. [jno]

Verhärtungen

- Indurationen, 12 – 48 Stunden nach Exposition (Typ IV Allergie). [mor]

Warzen

- Warzen. [jno] [vnf]
- Warzenbildung. [jno]

Allgemein

Seite

- Rechte Seite. [jno]

Abmagerung

- Gewichtsverlust bei Penicillosis (P. marneffeii). [vnf]
- Reduzierte Gewichtszunahme [Citrinin] (P. chrysogenum). [vnf]

Absonderungen

- Blutige Absonderungen. [psc]

Allergie

- Allergie auf Antibiotika. [vnf]
- Allergie auf Sporen. [vnf]
- Allergische Reaktion beim Partner beschrieben. [akb]
- Häufig allergische Reaktionen. [akb]
- Kreuzallergie mit verschiedenen Penizillinen, z.B. Cephalosporinen. [akb]
- Neigung zu Allergien. [jno] [vnf]

- Penizillinallergie. [mor]
- Schimmelallergie. [vnf]
- Totale allergische Reaktionen. [vnf]
- Zunahme der Allergien auf Penicillin-Antibiotika. [vnf]

Anaphylaktischer Schock

- Anaphylaxie (P. griseofulvin). [vnf]
- Anaphylaxie mit Hypotonie und Herzstillstand (Typ I Allergie). [mor]
- Anaphylaxie. [akb] [vnf]
- Penizilline gehören zu jenen Medikamenten, die am häufigsten eine anaphylaktische Reaktion auslösen. [mor]
- Viel ernsthafter ist der anaphylaktische Schock zu werten, der in manchen Fällen tödlich endet. [vnf]

Autoimmunkrankheit

- Exazerbation eine Myasthenie (Ampicillin). [akb]
- Kollagenosen. [jno]

Bewegung

- Verminderte motorische Aktivität [PR-Toxin] (P. roqueforti). [vnf]

Blut

- Verschiedene Störungen des Blutes. [vnf]

Blutdruck

- Beim typischen [Balkan endemische Nephropathie]-Syndrom kommen die besonderen klinischen Zeichen wie Hypertonie selten vor (P. cyclopium). [vnf]
- Blutdruckabfall. [akb]
- Der Blutdruck ist niedrig, manchmal nicht mehr messbar (Anaphylaxie). [vnf]
- Hypotonie (Typ I Allergie). [mor]
- Hypotonie bei Schock. [akb]
- Hypotonie. [jno]

Blutgefäße

- Citrinin: gefäßerweiternd (P. chrysogenum). [vnf]

Blutung

- Blutungsneigung (Ampicillin, parenteral). [akb]
- Blutungsneigung (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]
- Blutungsneigung bei Niereninsuffizienz (Amoxicillin) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]
- Erhöhte Blutungsneigung bei Niereninsuffizienten (Azlicillin, Ticarcillin, Mezlocillin). [mor]
- Hämatom (Pipracillin). [akb]
- Neigung zu Blutungen allgemein. [psc]
- Patulin, ein allgemeines Cytotoxin mit hämorrhagischen Effekten verursacht Blutungen bei Labortieren (P. cyclopium). [vnf]

Entzündung

- Akuter Gelenkrheumatismus. [jno] [vnf]
- Allergische Vaskulitis (Amoxicillin). [akb]
- Allergische Vaskulitis. [akb]
- Chronische Polyarthrit. [jno] [vnf]
- Die sehr seltenen Formen mit Vaskulitis und Nephritis können lebensbedrohend sein, 1 – 6 Wochen nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Häufig Phlebitis (Pipracillin). [akb]
- Häufig Thrombophlebitis (Pipracillin). [akb]
- Myositis. [jno]
- Neuritis (P. expansum). [vnf]
- Periarteriitis nodosa. [vnf]
- Periphere Neuritis (intramuskuläre Anwendung von Penicillin). [vnf]
- Periphere Neuritis (P. griseofulvin). [vnf]
- Phlebitis (Amoxicillin) (Ampicillin, parenteral) (Mezlocillin). [akb]
- Polyneuritis, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Polyneuritis. [jno]
- Tendinitis, Sehnenentzündung. [jno]
- Thrombophlebitis (Amoxicillin) (Ampicillin, parenteral) (Mezlocillin). [akb]
- Thrombophlebitis. [vnf]
- Vasculitis, Gefäßentzündung. [vnf]

Geschichte

Eigenanamnese

- Einer Patientin war kurz zuvor bei einer Wurzelbehandlung vom Zahnarzt ein Penicillindepot gelegt worden. [psc]

Hormone

- Östrogen-ähnliche Wirkung auf Kinder (P. griseofulvin). [vnf]

Infektionen

- Allgemein Infektionen. [vnf]
- Größere Empfänglichkeit gegenüber bakteriellen Infektionen. [psc]

Jahreszeiten

- Die Sporen haben einen Häufigkeitsgipfel im Herbst und einen geringeren im Frühjahr. [vnf]

Jarisch-Herxheimer-Reaktion

- Jarisch-Herxheimer-Reaktion. [mor] [vnf]

Kälte

- Gefühl von eisiger Kälte. [vnf]
- Frösteln, Gefühl von Eiseskälte in verschiedenen Stellen des Körpers, besonders im Thorax und in den Lenden. [jno] [vnf]

Kloni

- Myoklonien. [mor]

Kollagen

- Kollagenosen. [vnf]

Konvulsionen

- Es kann zu konvulsiven Momenten oder kurzen Konvulsionen kommen (Anaphylaxie). [vnf]
- Konvulsionen im Opisthotonus (intrathecale Anwendung von Penicillin). [vnf]
- Konvulsionen. [jno] [mor] [vnf]
- Krampfanfälle (Ampicillin, parenteral) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]
- Krampfanfälle, bei Niereninsuffizienz (Amoxicillin) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]
- Krämpfe (Hoigné-Syndrom). [mor]

Krämpfe

- Krämpfe [Mycophenolic acid] (P. roqueforti). [vnf]

Krankheit

Chronisch

- Dem Versiegen der eitrigen Entzündungen schließt sich dann sehr oft die Entwicklung eines chronischen Leidens an. [psc]
- Sykotischer Krankheitszustand. [jno]
- Veränderlicher sykotischer Zustände, mit Furunkel, Hautkrankheiten, Warzen und pucopurulenten Absonderungen. [jno]
- Tuberkulöse Krankheit. [jno]

Rückfälle

- Tendenz zu Rückfällen. [psc]

Krebs

- Penicillin-Säure hat antibiotische Fähigkeiten, aber zeigt krebserzeugende Wirkung bei Labortieren (P. cyclopium). [vnf]
- Rugulosin ist lebertoxisch und karzinogen (P. cyclopium). [vnf]
- Luteoskyrin ist karzinogen und ebenso leber- und nierentoxisch (P. piceum). [vnf]

Labor

Alkalische Phosphatase

- Alkal. Phosphatase erhöht (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]

Anämie

- Anämie (Amoxicillin). [akb]
- Anämie bei Penicillose (P. marneffeii). [vnf]
- Aplastische Anämie (Ampicillin). [akb]
- Aplastische Anämie. [akb]
- Das typische [Balkan endemische Nephropathie]- Syndrom zeigt sich in einer Anämie, selten mit schweren Verläufen (P. cyclopium). [vnf]

- Hämolytische Anämie (Amoxicillin). [akb]
- Hämolytische Anämie, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Hämolytische Anämie. [akb] [vnf]
- Immunhämolytische Anämie (Typ II Allergie). [mor]

Basophile Granulozyten

- Punktförmige Basophilie (P. griseofulvin). [vnf]

Bilirubin

- Hyperbilirubinämie (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]

Blutbildung

- Blutbildungsstörung. [akb]

Blutgerinnung

- Blutgerinnungsstörungen (Amoxicillin). [akb]
- Blutgerinnungsstörung bei Niereninsuffizienz (Amoxicillin) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]
- Blutgerinnungsstörung (Ampicillin, parenteral) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]. [akb]

Coombs-Test

- Coombstest, positiv (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]

CPK

- CPK-Erhöhung (Creatinin-Phospho-Kinase). [akb]

Elektrolyte

- Elektrolytstörung (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb] [mor]

γ-GT

- γ-GT, erhöht (Pipracillin). [akb]

Granulozyten

- Agranulozytose. [akb]
- Eosinophilie. [akb] [mor]
- Eosinophilie (Amoxicillin). [akb]
- Granulozytopenie (P. griseofulvin). [vnf]
- Granulozytopenie (Typ II Allergie). [mor]
- Neutropenie. [akb] [mor] [vnf]

Hämatokrit

- Hämatokrit-Abfall. [akb]

Hämoglobin

- Porphyrie (P. griseofulvin). [vnf]

Hämolyse

- Hämolyse. [akb]

Harnsäure

- Hyperurikämie. [akb]

Harnstoff

- Harnstoff-Spiegel erhöht (Pipracillin). [akb]

Kalium

- Hypokaliämie (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb] [mor]

Ketose

- Exzessive Aceton-Bildung, wie bei Diabetes mellitus [Roquefortin C] (P. roqueforti). [vnf]

Kreatinin

- Serumkreatinin-Anstieg. [akb]
- Serumkreatinin-Anstieg (Mezlocillin). [akb]

LDH

- LDH-Erhöhung. [akb]
- LDH, erhöht (Pipracillin). [akb]

Leukozyten

- Leukopenie. [akb]
- Leukozytopenie (P. griseofulvin). [vnf]

Natrium

- Hypernatriämie. [akb] [mor]
- Hypernatriämie (Ampicillin, parenteral) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]

Schilddrüse

- Hypothyreoidismus. [vnf]

Thrombozyten

- Chronische Thrombozytopenie. [jno] [vnf]
- Thrombozytopenie (Amoxicillin). [akb]
- Thrombozytopenie. [akb]
- Thrombozytose (Amoxicillin). [akb]

Transaminasen

- Häufig Transaminasenanstieg (Amoxicillin). [akb]
- Transaminasenanstieg (Mezlocillin) (Sultamicillin). [akb]
- Transaminasenanstieg, häufig bei Kindern (Pipracillin). [akb]
- Transaminasenanstieg. [akb]

Lähmung

- Ausgeprägte Lähmung [Roquefortin C] (P. roqueforti). [vnf]

Lebensalter

- Die Toxizität ist bei Kindern und älteren Menschen höher. [mor]

Lokomotorische Ataxie

- Ataxie (P. griseofulvin). [vnf]
- Ataxie bei Mäusen und Ratten [PR-Toxin] (P. roqueforti). [vnf]

Mesenchym

- Chronische Mesenchymatose oder chronische Endotheliose. [jno]

Missbildung

- Siamesische Zwillinge (P. griseofulvin). [vnf]

Modalität

- Besserung nach dem Schlaf. [vnf]
- Besserung: Ruhen; Wärme (heies Wetter); trockenes Wetter und durch Essen. [jno] [vnf]
- Empfindlichkeit gegen Klte. [jno]
- Verschlechterung nach dem Schlaf. [vnf]
- Verschlechterung: Kalt und feucht; Bewegung; 4 Uhr morgens. [jno] [vnf]

Mdigkeit

- Mdigkeit (P. griseofulvin). [vnf]

Nerven

- Cyclopiazon-Sure erwies sich als neurotoxisch und lsst bei Labortieren Pankreas und Milz erkranken (P. cyclopium). [vnf]
- Morbus Parkinson. [psc]
- Neurotoxisch [Penitrem A] (P. chrysogenum). [vnf]

Pilzerkrankungen

- Candidiasis (P. griseofulvin). [vnf]
- Pilzerkrankungen, die mit Salben unterdrckt werden, ziehen sich ins Krperinnere zurck. [psc]
- Pilzinfektionen in jedem denkbaren Bereich, auch bei Darnpilzen. [psc]

Reflexe

- Hyperreflexie (intrathecale Anwendung von Penicillin). [vnf]
- Hyperreflexie. [mor]

Serumkrankheit

- Serumkrankheit. [akb]
- Serumkrankheit (Amoxicillin). [akb]
- Serumkrankheit (Typ III Allergie). [mor]

Schock

- Schock. [akb]

Schmerz

- Die Schmerzen sind < bei Nacht und bei feuchtem, strmischem Wetter und > durch Druck und Wrme und bei trockenem, sonnigem Wetter (P. expansum). [vnf]
- Nimmt einen zerquetschenden und ausdrckenden Schmerz im ganzen Krper wahr wie von einer Erkltung. [vnf]
- Schmerzen kommen und gehen. [vnf]
- Schmerzen scharf und wundschmerzend. [vnf]

Gelenke

- Arthralgie. [akb]

- Arthralgien, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Arthro-muskuläre Schmerzen. [jno]
- Gelenkbeschwerden. [akb]
- Gelenkschmerzen mit Ödem der Lendenmuskeln, schlimmer durch leiseste Bewegung. [jno]
- Schmerz und/oder Schwellung der Gelenke, die eine Woche und gelegentlich länger anhalten. [vnf]

Muskeln

- Muskelschmerzen. [akb]

Nerven

- Nervenschmerzen. [akb]
- Neuralgien. [jno]
- Schwere neuralgische Schmerzen in feuchten Räumen (P. expansum, P. griseofulvin). [vnf]

Schwäche

- Abends sehr müde und erschöpft, nach kleinen Einkäufen am Nachmittag. [vnf]
- Asthenie. [jno]
- Energie sehr, sehr schwach. [vnf]
- Fühlt sich schwach. [vnf]
- Fühlte sich total schwach und erschöpft zwei Tage lang. [vnf]
- Häufiges Schwächegefühl. [vnf]

Schwellung

- Lymphadenopathie bei Penicillosis (P. marneffei). [vnf]
- Lymphadenopathie. [vnf]
- Lymphknotenschwellung (P. marneffei). [vnf]
- Schwellungsgefühl. [psc]

Sensibilität

- Parästhesien (Anaphylaxie). [vnf]
- Parästhesien (P. griseofulvin). [vnf]

Spastik

- Spastik der Muskulatur (intrathecale Anwendung von Penicillin). [vnf]

Speisen

Alkohol

- Disulfiram-ähnliche Reaktion auf Alkohol, wie bei Coprinus (P. griseofulvin). [vnf]

Käse

- „Ich muss mich entscheiden, entweder Schimmelkäse zu essen oder Alkohol zu trinken; mache ich beides, dann kann ich nicht trinken, ohne dass alles herausläuft oder mein Mund völlig versagt (P. roqueforti). [vnf]

Süßigkeiten

- Sie hat das ungewöhnliche Bedürfnis nach etwas Süßem. [vnf]

Syndrom

- Burnout-Syndrom. [jno] [psc]
- Down-Syndrom (P. griseofulvin). [vnf]
- Grippeähnliches Syndrom. [akb]
- Hoigné-Syndrom, Pseudoanaphylaxie. [mor]
- Löffler-Syndrom, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Lupus-ähnliches Syndrom (P. griseofulvin). [vnf]
- Lyell-Syndrom, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Lyell-Syndrom, Dermatitis combustiformis, 12 – 48 Stunden nach Exposition (Typ IV Allergie). [mor]
- Stevens-Johnson-Syndrom, 12 – 48 Stunden nach Exposition (Typ IV Allergie). [mor]

Thrombose

- Bei Kindern nach i.m. Injektion von Depotpenizillinen Thrombosen oder Muskelveränderungen (Kontrakturen, Lähmungen) infolge von Gewebeschäden. [mor]
- Venenthrombose (Amoxicillin) (Ampicillin, parenteral) (Pipracillin). [akb]

Toxine

- Citrinin (P. notatum). [vnf]
- Cyclopiazonic acid (P. griseofulvin). [vnf]
- Mycophenolic acid (P. roqueforti). [vnf]
- Patulin (P. roqueforti). [vnf]
- Penicillic acid (P. griseofulvin). [vnf]
- Penicillin (P. notatum). [vnf]
- PR-Toxin (P. roqueforti). [vnf]
- Roquefortine A, B + C (P. notatum, P. roqueforti). [vnf]
- Verrucosidin (P. griseofulvin). [vnf]

Überempfindlichkeit

- Überempfindlichkeits-Reaktionen. [vnf]

Unwohl

- Allgemeines Krankheitsgefühl, 7 – 14 Tage nach Exposition (Typ III Allergie). [mor]
- Unwohlsein. [akb]

Vitamine

- Vitaminmangel. [vnf]

Wassersucht

- Angiödem (Amoxicillin). [akb]
- Angiödem (P. griseofulvin). [vnf]
- Angiödem (Typ I Allergie). [mor]
- Angiödem. [akb] [vnf]
- Angioneurotisches Ödem. [jno]

- Beim typischen [Balkan endemische Nephropathie]- Syndrom fehlen die besonderen klinischen Zeichen wie Ödeme (P. cyclopium). [vnf]
- Die Urtikaria kann sich zum angioneurotischen Ödem ausweiten mit subfebriler Temperatur. [vnf]
- Ödem. [akb] [jno]
- Patulin, ein allgemeines Cytotoxin mit hämorrhagischen Effekten verursacht die Bildung von Ödemen bei Labortieren (P. cyclopium). [vnf]

Wetter

- Schmerzen < bei feuchtem, stürmischen Wetter, > trockenem, sonnigem Wetter, ähnlich wie Rhus tox. (P. expansum). [vnf]

Zittern

- Bei Labortieren wird von Penitrem A anhaltendes Zittern ausgelöst, das lange Zeit anhält und von anderen Funktionen nicht unterbrochen wird (P. chrysogenum). [vnf]
- Die Penicillium-Arten werden verdächtig Zittern auszulösen (P. roqueforti). [vnf]
- Intensionstremor [Roquefortin C] (P. roqueforti). [vnf]
- Penitrem A und Roquefortin C stehen vor allem im Verdacht tremorgen zu sein. [vnf]
- Tremor (Pipracillin). [akb]
- Zittern (P. roqueforti). [vnf]
- Zittern auslösend [Penitrem A + B, Cyclopiazon-Säure] (P. chrysogenum, P. griseofulvin). [vnf]

Zucken

- Muskelzucken (Ampicillin, parenteral) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]
- Muskelzucken an kleinen Stellen, z. B. Augenlid. [psc]
- Muskelzuckungen, bei Niereninsuffizienz (Amoxicillin) (Mezlocillin) (Pipracillin). [akb]

Zyanose

- Zyanose (Hoigné-Syndrom). [mor]

Verwandtschaft

Differentialdiagnose

- Das Mittel hilft häufig nach einer interkurrenten Dosis Rhus-tox., und umgekehrt, wenn das Letztere angezeigt ist, aber nicht richtig wirkt, wird eine Dosis Penicillium dessen Wirkung anregen (P. expansum). [vnf]
- Die Symptome von Tremigen A sind im Wesentlichen dieselben wie bei Claviceps paspali, und Neotyphodium lolii (P. chrysogenum). [vnf]
- Griseofulvin ähnelt strukturell Colchicin [aktiver Inhaltsstoff von Colchicum autumnale] (P. griseofulvin). [vnf]
- Schimmelallergie: Alternaria, Aspergillus, Drechslera (Welminthosporium) und Penicillium. [vnf]
- Wenn es angezeigt ist, wirkt es schnell und ist eine gute Begleiterin von Rhus tox. und ist komplementär zu Pulsatilla und Mercurius (P. expansum). [vnf]

Konkordant

- Es wird sehr häufig mit Streptococcinum und Carcinosinum kombiniert. [psc]

Resistenz

- Resistenzentwicklung gegen E. coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonellen, Shigellen, Hämophilus influenza, Morganella morganii und Providencia rettgeri (Ampicillin). [akb]

Quellen

- Arzneimittel-Kursbuch 2007/08. Berlin: A.V.I. Arzneimittel-Verlag 2007 [akb]
- Julian Orthon André. Dictionary of Homoeopathic Materia Medica of 131 New Homoeotherapeutics. New Delhi: B. Jain 1984 [jno]
- Julian O.A. Materia Medica of New Homoeopathic Remedies. Beaconsfield, Bucks: Beaconsfield 1990 [jno]
- Müller-Oerlinghausen B. Lasek R. Düppenbecker H. Munter K.-H. (Hrsg.) Handbuch der unerwünschten Arzneimittelwirkungen. München, Jena: Urban & Fischer 1999 [mor]
- Petras Christiane. Die Nosodentherapie in der Homöopathie. Hintergrund und praktische Anwendung. 5. Auflage. Selbstverlag 2019 [psc]
- Vermeulen Frans. Fungi. Kingdom Fungi. Spectrum Materia Medica. Volume 2. Haarlem: Emrys 2007 [vnf]